

Les parties II, III et IV sont des applications indépendantes de la partie I. Dans la partie préliminaire ainsi que dans la première partie, K désigne un corps qui peut être quelconque. Dans les trois parties d'applications, K sera égal respectivement à $\mathbb{R}$, à $\mathbb{Q}(X)$, et enfin à $\mathbb{C}(X)$. L'anneau des polynômes à coefficients dans K sera le plus souvent noté $K[X]$ – cependant, il sera noté $K[Y]$ lorsque K sera lui même un corps de fractions rationnelles.

D'autre part, soient m, n deux entiers naturels non-nuls. Si $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q(X) = \sum_{j=0}^m b_j X^j$ sont deux éléments de $K[X]$ de degrés respectifs n et m , on appelle résultant de P et Q (noté $\text{Res}_K(P, Q)$, ou bien $\text{Res}(P, Q)$ si aucune confusion n'est possible) le déterminant de la matrice carrée à coefficients dans K de taille $(n+m, n+m)$ suivante, dite *matrice résultante* :

$$\begin{pmatrix} a_0 & a_1 & \dots & a_{n-1} & a_n & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_0 & \dots & a_{n-1} & a_n & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & a_0 & a_1 & a_2 & \dots & a_{n-1} & a_n \\ b_0 & b_1 & \dots & b_{m-1} & b_m & 0 & \dots & 0 & 0 \\ 0 & b_0 & \dots & b_{m-1} & b_m & 0 & \dots & 0 & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & b_0 & b_1 & \dots & b_{m-1} & b_m & 0 \\ 0 & \dots & 0 & b_0 & b_1 & \dots & b_{m-1} & b_m & 0 \end{pmatrix}$$

$\underbrace{\hspace{10em}}_n \quad \underbrace{\hspace{10em}}_m$

où chaque a_i apparaît exactement m fois, et chaque b_j apparaît n fois. Noter que les m premiers coefficients diagonaux sont égaux à a_0 , et que les n derniers sont égaux à b_m .

Enfin, si A est un sous-anneau de K , on notera $A[X]$ le sous-anneau de l'anneau des polynômes $K[X]$, constitué des polynômes dont tous les coefficients sont dans A .

Partie préliminaire

Soit A un sous-anneau de K .

0-1- Vérifier que $A[X]$ est bien un sous anneau de $K[X]$.

0-2- Montrer que si P, Q sont deux éléments de $A[X]$, alors $\text{Res}_K(P, Q)$ reste un élément de A .

0-3- Soit $\mathbb{C}[X][Y]$ le sous-anneau de l'anneau des polynômes $\mathbb{C}(X)[Y]$ sur le corps $\mathbb{C}(X)$ défini dans l'introduction pour $A = \mathbb{C}[X]$ et $K = \mathbb{C}(X)$. Montrer que tout élément P de $\mathbb{C}[X][Y]$ s'écrit de façon unique sous la forme $P(X, Y) = \sum_{i,j \geq 0} a_{i,j} X^i Y^j$ avec $a_{i,j} \in \mathbb{C}$ nul sauf pour un nombre fini de couples (i, j) . En déduire que si $P \neq 0$ est un élément de $\mathbb{C}[X][Y]$ s'écrivant comme ci-dessus, alors le nombre $d(P) = \text{Max}\{i + j \mid a_{i,j} \neq 0\}$ est un entier naturel bien défini, appelé degré total de P .

Partie I : La propriété fondamentale du résultant.

Soient $P(X) = \sum_{i=0}^n a_i X^i$ et $Q(X) = \sum_{j=0}^m b_j X^j$ deux polynômes de $K[X]$ de degrés n et m .

I-1- Montrer que les polynômes P et Q ne sont pas premiers entre eux dans $K[X]$ si, et seulement si, il existe deux polynômes A et B non-nuls de $K[X]$, de degrés $\deg A < m$ et $\deg B < n$, tels que $AP = BQ$.

I-2- On note $K[X]_d$ le sous-espace vectoriel de $K[X]$ constitué des polynômes de degré inférieur ou égal à d .

I-2-a- Quelle est la dimension sur K de $K[X]_d$?

I-2-b- Soit f l'application

$$f : \begin{cases} K[X]_{m-1} \times K[X]_{n-1} & \rightarrow K[X]_{m+n-1} \\ (A, B) & \mapsto AP + BQ. \end{cases}$$

Montrer que f est une application linéaire, et que sa matrice dans des bases ad-hoc que l'on précisera des espaces vectoriels source et but est la transposée de la matrice résultante de l'énoncé.

I-3- Montrer que P et Q sont premiers entre eux dans $K[X]$ si, et seulement si, $\text{Res}_K(P, Q) \neq 0$.

I-4- Montrer que pour tout λ non nul, on a

$$\text{Res}_{\mathbb{C}}(\lambda^n P(\frac{X}{\lambda}), \lambda^m Q(\frac{X}{\lambda})) = \lambda^{mn} \text{Res}_{\mathbb{C}}(P(X), Q(X)).$$

Partie II : Une courbe unicursale.

On considère la courbe plane de $\mathbb{R}^2$ paramétrée par $t \in \mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x(t) = t^2 + t \\ y(t) = t^3 + 2t^2 \end{cases}$$

Quelle est l'équation cartésienne de la courbe dans le plan ?

Partie III : Entiers algébriques.

On note $\mathcal{O}$ l'ensemble des nombres complexes z pour lesquels il existe un polynôme non-nul $P(X) \in \mathbb{Z}[X]$ (l'anneau des polynômes à coefficients dans $\mathbb{Z}$), qui soit *unitaire* (c'est-à-dire par définition de coefficient dominant égal à 1), et vérifiant $P(z) = 0$.

III-1- Soient z_1 et z_2 des éléments de $\mathcal{O}$, annulant les polynômes P_1 et P_2 de degrés respectifs n_1 et n_2 . Montrer que le polynôme (en X) $\text{Res}_{Q(X)}(P(X-Y), P(Y))$ est un élément de $\mathbb{Z}[X]$, unitaire de degré $n_1 n_2$ annulant la somme $z_1 + z_2$.

III-1- Montrer que $\mathcal{O}$ est un sous-anneau de $\mathbb{C}$.

Partie IV : Équations algébriques : le théorème de Bézout faible.

On se donne deux polynômes P et Q non nuls de $\mathbb{C}[X][Y]$, et on se propose d'étudier le nombre de solutions (z_1, z_2) dans $\mathbb{C}^2$ du système d'équations

$$\begin{cases} P(z_1, z_2) = 0 \\ Q(z_1, z_2) = 0 \end{cases}.$$

On considère les deux conditions suivantes sur P et Q :

(C_1) P et Q sont premiers entre eux dans l'anneau de polynômes $\mathbb{C}(X)[Y]$ à coefficients dans le corps $\mathbb{C}(X)$.

(C_2) En notant les décompositions de P et Q sous la forme $P(X, Y) = \sum_{i=0}^n P_i(X)Y^i$ et $Q(X, Y) = \sum_{j=0}^m Q_j(X)Y^j$ avec $P_n(X)Q_m(X) \neq 0$ dans $\mathbb{C}[X]$, il n'y a aucun facteur non-constant commun aux $n + m + 2$ polynômes

$$P_0(X), P_1(X), \dots, P_n(X), Q_0(X), \dots, Q_m(X)$$

dans l'anneau des polynômes $\mathbb{C}[X]$.

Enfin, on note $d(P)$ et $d(Q)$ les degrés totaux de P et de Q définis en 0-3-.

IV-1- Exemples. Parmi les trois couples de polynômes suivants, lesquels vérifient (C_1)? Lesquels vérifient (C_2)? Quels sont leurs degrés totaux?

$$\begin{aligned} (P_1(X, Y) = XY^2 + X, \quad Q_1(X, Y) = X^2Y^3 + XY^2); \\ (P_2(X, Y) = XY^2 + X + 1, \quad Q_2(X, Y) = Q_1(X, Y)); \\ (P_3(X, Y) = Y + X, \quad Q_3(X, Y) = X^2 - Y^2). \end{aligned}$$

IV-2-a- On suppose que P et Q vérifient (C_1). Montrer qu'il existe trois polynômes non nuls $A, B \in \mathbb{C}[X][Y]$, et $C \in \mathbb{C}[X]$, tels que $AP + BQ = C$.

IV-2-b- En déduire que le système étudié n'a qu'un nombre fini de solutions si, et seulement si, P et Q vérifient (C_1) et (C_2).

IV-3- Montrer que, par un changement de variables linéaire en (x, y) , on peut se ramener au cas où $n = d(P)$ et $m = d(Q)$.

IV-4- On pose $R(X) = \text{Res}_{\mathbb{C}(X)}(P(X, Y), Q(X, Y))$. La fonction polynomiale de $\mathbb{C}$ dans $\mathbb{C}$ associée à R sera notée $R(z)$.

On suppose que $n = d(P)$ et $m = d(Q)$. Montrer que $\frac{R(z)}{z^{d(P)d(Q)}}$ admet une limite dans $\mathbb{C}$ lorsque $|z| \rightarrow +\infty$.

IV-5- On suppose que P et Q vérifient (C_1) et (C_2). Montrer que le nombre de solutions du système est inférieur ou égal au produit $d(P)d(Q)$.

IV-6- Le système d'équations proposé a-t-il toujours $d(P)d(Q)$ solutions lorsque P et Q satisfont (C_1) et (C_2)?